

## Fjernelse af dræn

Hvis drænet har siddet i trommehinden mere end 2 år og der ikke er problemer, er det tid at fjerne det.

Dette gøres for at forhindre evt. utilsigtede bivirkninger af for lang drænbehandling.

### Før operationen:

Af sikkerhedsgrunde skal mavesækken være tom ved operationen. Dvs. barnet må spise og drikke som aftalt ved forundersøgelsen.

Se regler for faste under det pkt. på hjemmesiden.

Hvis der er udleveret Pamol stikpillen gives den **1 time** før operationen.

**Se film om bedøvelse på [www.HCAND.dk](http://www.HCAND.dk)**

**Ved feber og hoste kontakt klinikken.**

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden.

### Under operationen:

Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske. Indsovningen varer under 1 minut. Drænet/drænene fjernes og evt. arvæv fjernes og der pålægges en lille lap.

### Efter operationen:

Senere på dagen vil barnet være upåvirket af operationen.

De første par dage efter operationen kan det flyde ganske lidt fra øret.

### Kontrol:

8 UGER efter operationen skal patienten møde til kontrol evt. med høreprøve. Herefter vil vi kontrollere ørerne efter ca. 3-4 mdr., hvis alt er i orden vil I blive afsluttet. Forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte klinikken ved tvivlsspørgsmål.

VÆR **OPMÆRKSOM** PÅ AT MAN IKKE MÅ FÅ VAND I ØRERNE FØR MAN HAR VÆRET KONTROLLERET 1. GANG.